

14. 7. 2004

日本国特許庁
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日
Date of Application: 2003年 7月31日

REC'D 02 SEP 2004

WIPO

PCT

出願番号
Application Number: 特願2003-204275
[ST. 10/C]: [JP2003-204275]


出願人
Applicant(s): 鐘淵化学工業株式会社

PRIORITY DOCUMENT
SUBMITTED OR TRANSMITTED IN
COMPLIANCE WITH
RULE 17.1(a) OR (b)

2004年 8月19日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

小川



【書類名】 特許願

【整理番号】 TKS-5069

【提出日】 平成15年 7月31日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 A23D 9/007
A23L 1/052
A61K 35/78

【発明者】

 【住所又は居所】 兵庫県神戸市垂水区塩屋町 6 - 3 1 - 1 7 三青荘

 【氏名】 荒井 直樹

【発明者】

 【住所又は居所】 兵庫県加古川市加古川町栗津 4 6 3 - 2

 【氏名】 岸田 秀之

【発明者】

 【住所又は居所】 兵庫県高砂市荒井町小松原 4 - 6 6 9 - 3

 【氏名】 池原 俊則

【発明者】

 【住所又は居所】 兵庫県加古川市平岡町二俣 8 6 1 - 9

 【氏名】 前 辰正

【特許出願人】

 【識別番号】 000000941

 【氏名又は名称】 鐘淵化学工業株式会社

 【代表者】 武田 正利

【手数料の表示】

 【予納台帳番号】 005027

 【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

 【物件名】 明細書 1

 【物件名】 要約書 1

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 生活習慣病予防・改善用の油脂加工組成物

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 グラブレン、グラブリジン、グラブロール、3'-ヒドロキシ-4'-O-メチルグラブリジン、4'-O-メチルグラブリジン、ヒスパグラブリジン B からなる群より選ばれた少なくとも 1 つの化合物を溶解している油脂を含有し、該化合物をその総量として 0.01～30 重量%含有することを特徴とする生活習慣病予防及び／又は改善用の油脂加工組成物。

【請求項 2】 グラブレン、グラブリジン、グラブロール、3'-ヒドロキシ-4'-O-メチルグラブリジン、4'-O-メチルグラブリジン、ヒスパグラブリジン B からなる群より選ばれた少なくとも 1 つの化合物を溶解している油脂を含有し、該化合物をその総量として 0.01～30 重量%含有することを特徴とする体重増加抑制及び／又は改善用の油脂加工組成物。

【請求項 3】 グラブレン、グラブリジン、グラブロール、3'-ヒドロキシ-4'-O-メチルグラブリジン、4'-O-メチルグラブリジン、ヒスパグラブリジン B からなる群より選ばれた少なくとも 1 つの化合物を溶解している油脂を含有し、該化合物をその総量として 0.01～30 重量%含有することを特徴とするインスリン抵抗性改善用の油脂加工組成物。

【請求項 4】 グラブレン、グラブリジン、グラブロール、3'-ヒドロキシ-4'-O-メチルグラブリジン、4'-O-メチルグラブリジン、ヒスパグラブリジン B からなる群より選ばれた少なくとも 1 つの化合物を、その総量として成人一人一日当たり 0.01～10 mg/kg 体重を摂取できる量を含むことを特徴とする請求項 1～3 のいずれか 1 項記載の油脂加工組成物。

【請求項 5】 油脂が中鎖脂肪酸トリグリセリド及び／又は部分グリセリドを含むグリセリン脂肪酸エステルである、請求項 1～4 のいずれか 1 項記載の油脂加工組成物。

【請求項 6】 油脂が中鎖脂肪酸トリグリセリドを 50 重量%以上含むグリセリン脂肪酸エステルである、請求項 1～5 のいずれか 1 項記載の油脂加工組成物。

【請求項 7】 油脂が部分グリセリドを 5 0 重量%以上含むグリセリン脂肪酸エステルである、請求項 1 ～ 5 のいずれか 1 項記載の油脂加工組成物。

【請求項 8】 生活習慣病が内臓脂肪型肥満、2 型糖尿病、高脂血症、高血圧症からなる群より選ばれた少なくとも 1 種である、請求項 1 記載の油脂加工組成物。

【請求項 9】 生活習慣病が内臓脂肪型肥満及び／又は 2 型糖尿病である、請求項 1 記載の油脂加工組成物。

【請求項 1 0】 飲食用である請求項 1 ～ 9 のいずれか 1 項記載の油脂加工組成物。

【請求項 1 1】 医薬用である請求項 1 ～ 9 のいずれか 1 項記載の油脂加工組成物。

【請求項 1 2】 請求項 1 ～ 1 1 のいずれか 1 項記載の油脂加工組成物を封入してなるソフトカプセル。

【請求項 1 3】 グラブレン、グラブリジン、グラブロール、3'-ヒドロキシ-4'-O-メチルグラブリジン、4'-O-メチルグラブリジン、ヒスパグラブリジン B からなる群より選ばれた少なくとも 1 つの化合物を、その総量として、カプセル当たり 0. 0 1 ～ 1 5 0 m g 含むことを特徴とする請求項 1 2 記載のソフトカプセル。

【請求項 1 4】 グラブレン、グラブリジン、グラブロール、3'-ヒドロキシ-4'-O-メチルグラブリジン、4'-O-メチルグラブリジン、ヒスパグラブリジン B からなる群より選ばれた少なくとも 1 つの化合物が、グリキリリザ・グラブラ (Glycyrrhiza glabra) 由来である請求項 1 ～ 1 3 のいずれか 1 項記載の油脂加工組成物。

【発明の詳細な説明】

【0 0 0 1】

【発明の属する技術分野】

本発明は、健康食品や保健機能食品（特定保健用食品、栄養機能食品）などの飲食品、又は医薬品、医薬部外品、化粧品などに使用することができる生活習慣病予防及び／又は改善用の油脂加工組成物、及び／又は体重増加抑制及び／又は

改善用の油脂加工組成物に関する。

【0002】

【従来の技術】

近年、食生活の欧米化や運動不足など生活環境の悪化による肥満者の数は増大し、肥満の増加に伴う生活習慣病が大きな社会問題として取り上げられるようになった。ここでの生活習慣病としては内臓脂肪型肥満、2型糖尿病、高脂血症、高血圧症などが挙げられ、これらはやがて動脈硬化症などの血管病を引き起こすマルチプル・リスク・ファクター症候群である。そこで肥満による体重増加を抑制し、これらの生活習慣病を予防及び／又は改善する効果を有する組成物が望まれており、その組成物の形態としては、日常的に摂取することができる健康食品や保健機能食品（特定保健用食品、栄養機能食品）などの飲食品、又は医薬品、医薬部外品、化粧品などが望まれている。

【0003】

マルチプル・リスク・ファクター症候群は、Reavenによるシンドローム X (Diabetes, 37, 1595~1607, 1988)、Kaplanによる死の四重奏 (Archives of Internal Medicine, 149, 1514~1520, 1989)、DeFronzoによるインスリン抵抗性症候群 (Diabetes Care, 14, 173~194, 1991)、松澤による内臓脂肪症候群 (Diabetes/Metabolism Reviews, 13, 3~13, 1997) と同じ病態概念であるメタボリックシンドロームと考えられ、これら症候群に共通する原因因子はインスリン抵抗性であると考えられている。

【0004】

インスリン抵抗性の改善薬であるトログリタゾン、ピオグリタゾン、ロシグリタゾンなどのチアゾリジン誘導体は、核内レセプターであるペルオキシソーム増殖剤応答性受容体 γ (peroxisome proliferator-activated receptor γ : PPAR γ) のリガンドとして働き、2型糖尿病患者におけるインスリン抵抗性を改善し、血糖低下作用を示すことが明らかにされている。さらに、これらチアゾリジン誘導体は、皮下脂肪を増加させるが内臓脂肪を低減させること、血中遊離脂肪酸低下作用、血圧低下作用、抗炎症作用などを示すことが明らかにされている（非特許文献1を参照）。すなわち、PPAR γ リガンド活性を有する化合物は

、インスリン抵抗性を改善し、内臓脂肪型肥満、2型糖尿病、高脂血症、高血圧症などの生活習慣病の予防及び／又は改善に有効である。

【0005】

甘草はマメ科カンゾウ属 (*Glycyrrhiza*属) の植物であり、食用や医薬用 (生薬) として利用されており、主な品種としてグリキルリーザ・グラブラ (*Glycyrrhiza. glabra*)、*G. ウラレンシス* (*G. uralensis*)、*G. インフラータ* (*G. inflata*) などが挙げられる。いずれの品種にも親水性成分であるグリチルリチン (グリチルリチン酸) は含まれているが、疎水性成分のフラボノイドは品種によって特異的な化合物が含まれている。この品種特異的なフラボノイドは、甘草の品種同定に利用されることもある。

【0006】

甘草から得られる抽出物のうち、甘草フラボノイドを多く含み、グリチルリチン含量が極微量である甘草疎水性抽出物は、マルチプル・リスク・ファクター症候群の予防及び／又は改善に有用であることが見出されている (特許文献1を参照)。さらに最新の研究において、この甘草疎水性抽出物がPPAR γ リガンド活性を有し、その活性成分はフラボノイドであることが見出されている (特許文献2を参照)。その中でも、*G. グラブラ*由来の抽出物に含有される特徴的なフラボノイドであるグラブレン、グラブリジン、グラブロール、3'-ヒドロキシ-4'-O-メチルグラブリジン、4'-O-メチルグラブリジン及びヒスパグラブリジンBが高いPPAR γ リガンド活性を有していることが見出されている (特許文献2を参照)。

【0007】

一方、甘草疎水性抽出物に含まれる甘草疎水性フラボノイドは、水にほとんど溶解せず、また、有機溶媒抽出物のままでは固結し易く、着色の進行も早いなど、経時的変化が著しいという性質があるため、利用し難い。それを解決するために、甘草疎水性フラボノイドを中鎖脂肪酸トリグリセリドに溶解し、その甘草疎水性フラボノイド製剤を酸化防止剤、抗菌剤、酵素阻害剤、着色料、抗腫瘍剤、抗アレルギー剤、抗ウイルス剤として利用している (特許文献3を参照)。しかし、特許文献3では、化合物の限定がなく、また、生活習慣病の予防及び／又は

改善剤としての利用、さらに体重増加抑制及び／又は改善作用は知られていない。
。

【0008】

【特許文献1】 WO 02/47699

【0009】

【特許文献2】 特願 2002-226486

【0010】

【特許文献3】 特許 2794433号

【0011】

【非特許文献1】 Martens, F. M., et al, Drugs, 62, 1463~1480, 2002

【0012】

【発明が解決しようとする課題】

上記に鑑み、グラブレン、グラブリジン、グラブロール、3'-ヒドロキシ-4'-O-メチルグラブリジン、4'-O-メチルグラブリジン及びヒスパグラブリジンBは、PPAR γ リガンド活性を有しているため、これらはインスリン抵抗性を改善し、内臓脂肪型肥満、2型糖尿病、高脂血症、高血圧症などの生活習慣病の予防及び／又は改善に有効である。しかし、該化合物は、水への溶解性や安定性が良くないことから、飲食品や医薬品などへの利用が困難であるという欠点があった。よって、本発明は、グラブレン、グラブリジン、グラブロール、3'-ヒドロキシ-4'-O-メチルグラブリジン、4'-O-メチルグラブリジン、ヒスパグラブリジンBからなる群より選ばれた少なくとも1つの化合物を含有し、健康食品や保健機能食品（特定保健用食品、栄養機能食品）などの飲食品、又は医薬品、医薬部外品、化粧品などに利用することができる生活習慣病予防及び／又は改善用の組成物、及び／又は体重増加抑制及び／又は改善用の組成物を提供することを課題とする。

【0013】

【課題を解決するための手段】

本発明者らは、上記実情に鑑み鋭意研究を行った結果、グラブレン、グラブリジン、グラブロール、3'-ヒドロキシ-4'-O-メチルグラブリジン、4'-

Ｏ－メチルグラブリジン、ヒスパグラブリジンＢをある種の油脂に特異的に溶解することにより、これらの化合物の安定性が向上し、また、飲食品、医薬品、医薬部外品、化粧品などへの加工性も向上することを見出し、さらに過栄養下での体重増加を抑制する作用を有することを見出し、本発明を完成させるに至った。

【0014】

すなわち、本発明の第１は、グラブレン、グラブリジン、グラブロール、３’－ヒドロキシ－４’－Ｏ－メチルグラブリジン、４’－Ｏ－メチルグラブリジン、ヒスパグラブリジンＢからなる群より選ばれた少なくとも１つの化合物を溶解している油脂を含有することを特徴とする生活習慣病予防及び／又は改善用の油脂加工組成物、本発明の第２はグラブレン、グラブリジン、グラブロール、３’－ヒドロキシ－４’－Ｏ－メチルグラブリジン、４’－Ｏ－メチルグラブリジン、ヒスパグラブリジンＢからなる群より選ばれた少なくとも１つの化合物を溶解している油脂を含有することを特徴とする体重増加抑制及び／又は改善用の油脂加工組成物に関する。

【0015】

【発明の実施の形態】

以下に、本発明の実施の形態を詳しく説明する。

【0016】

本発明の生活習慣病予防及び／又は改善用の油脂加工組成物、さらに体重増加抑制及び／又は改善用の油脂加工組成物は、グラブレン、グラブリジン、グラブロール、３’－ヒドロキシ－４’－Ｏ－メチルグラブリジン、４’－Ｏ－メチルグラブリジン、ヒスパグラブリジンＢからなる群より選ばれた少なくとも１つの化合物を溶解している油脂を含有することを特徴としている。ここで述べる油脂加工組成物とは、該化合物を溶解した油脂、及びその油脂を含有してなる飲食用、医薬用、医薬部外用、化粧用等の組成物である。すなわち、該化合物を油脂に溶解した組成物、及びこれに他の対象物を混合してなる組成物、さらにはこれを加工してなる飲食用、医薬用、医薬部外用、化粧用等の組成物のいずれも油脂加工組成物に含まれる。該化合物の中でも、グラブリジンを含有し、かつグラブレン、グラブロール、３’－ヒドロキシ－４’－Ｏ－メチルグラブリジン、４’－Ｏ－

メチルグラブリジン、ヒスパグラブリジンBからなる群より選ばれた少なくとも1つの化合物を含有することが好ましい。さらに、グラブリジン及びグラブレンを含有し、かつグラブロール、3'-ヒドロキシ-4'-O-メチルグラブリジン、4'-O-メチルグラブリジン、ヒスパグラブリジンBからなる群より選ばれた少なくとも1つの化合物を含有することがより好ましい。とりわけ、グラブレン、グラブリジン、グラブロール、3'-ヒドロキシ-4'-O-メチルグラブリジン、4'-O-メチルグラブリジン、ヒスパグラブリジンBを全て含有していることが最も好ましい。その総量としては、油脂加工組成物中に0.01~30重量%含有していることが好ましく、さらに0.1~30重量%含有していることがより好ましく、とりわけ1~10重量%含有していることが特に好ましい。30重量%以上では該化合物を均一に油脂に溶解できない場合がある。また、0.01重量%以下では本発明の効果が十分に発揮されない場合がある。該化合物は、トログリタゾンやピオグリタゾンなどのチアゾリジン誘導体と同様に、PPAR γ リガンド活性を有していることから、インスリン抵抗性を改善し、メタボリックシンドロームを構成する内臓脂肪型肥満、2型糖尿病、高脂血症、高血圧症などの生活習慣病の予防及び／又は改善に有効である。

【0017】


また本発明の油脂加工組成物に含まれるグラブレン、グラブリジン、グラブロール、3'-ヒドロキシ-4'-O-メチルグラブリジン、4'-O-メチルグラブリジン、ヒスパグラブリジンBは、高脂肪・高糖分食の摂取等の過栄養が引き起こす肥満による体重増加の抑制及び／又は改善に有効である。

【0018】

本発明で使用するグラブリジン (glabridin)、3'-ヒドロキシ-4'-O-メチルグラブリジン (3'-hydroxyl-4'-O-methylglabridin)、4'-O-メチルグラブリジン (4'-O-methylglabridin)、ヒスパグラブリジンB (hyspaglabridin B) はイソフラバン (isoflavan) に分類されるフラボノイドであり、下記一般式 (1) にて表される化合物である。

【0019】

【化1】




〔グラブリジン $\text{R1}=\text{H}$ 、 $\text{R2}=\text{OH}$ 、3'-ヒドロキシ-4'-O-メチルグラブリジン $\text{R1}=\text{OH}$ 、 $\text{R2}=\text{OCH}_3$ 、4'-O-メチルグラブリジン $\text{R1}=\text{H}$ 、 $\text{R2}=\text{OCH}_3$ 、ヒスパグラブリジンBは $\text{R1}\sim\text{R2}$ が $-\text{CH}=\text{CH}-\text{C}(\text{CH}_3)_2-\text{O}-$ で六員環を構成する。〕

本発明で使用するグラブレ ne (glabrene) は、イソフラブ-3-エン (isoflav-3-ene) に分類されるフラボノイドであり、下記式 (2) で表される化合物である。

【0020】


【化2】



本発明で使用するグラブロー l (glabrol) は、フラバノン (flavanone) に分類されるフラボノイドであり、下記式 (3) で表される化合物である。

【0021】

【化3】



グラブレン、グラブリジン、グラブロール、3'-ヒドロキシ-4'-O-メチルグラブリジン、4'-O-メチルグラブリジン、ヒスパグラブリジンBは、甘草の中でもグリキリーザ・グラブラ (*Glycyrrhiza glabra*) に特異的に含まれる成分であり、他品種にはほとんど含まれていない。ただし、G. グラブラと他品種との雑種においては含まれる場合もある。該化合物は、ODSなどの逆相カラムを用いたHPLC分析により、他のフラボノイド成分と分離して検出、定量することができる。

【0022】

本発明において、グラブレン、グラブリジン、グラブロール、3'-ヒドロキシ-4'-O-メチルグラブリジン、4'-O-メチルグラブリジン、ヒスパグラブリジンBを得る方法は、特に限定されないが、G. グラブラ種の甘草より得ることができる。該化合物を甘草から得る場合、その方法は特に限定されないが、エタノール、酢酸エチル、アセトンなどの有機溶媒による抽出で得られる甘草疎水性抽出物に該化合物は含まれ、抽出物のまま使用してもよいが、さらにカラム処理、脱臭処理、脱色処理などにより粗精製又は精製したものを使用してもよい。勿論、該化合物は、その他植物等の天然由来、化学合成あるいは培養細胞などにより生合成した化合物のいずれも本発明において使用することができる。また、該化合物は、精製したものを使用することができるが、飲食品、医薬品、医薬部外品、化粧品などとして不適当な不純物を含有しない限り粗精製したものを使用することもできる。

【0023】

本発明で使用する油脂は、中鎖脂肪酸トリグリセリドを含むグリセリン脂肪酸エステルであって、好ましくは中鎖脂肪酸トリグリセリドを50重量%以上含むグリセリン脂肪酸エステル、より好ましくは中鎖脂肪酸トリグリセリドを70重量%以上含むグリセリン脂肪酸エステルである。ここでの中鎖脂肪酸トリグリセリドは、炭素原子数6～12の脂肪酸を構成脂肪酸とし、その脂肪酸の構成比率は特に限定されないが、炭素原子数8～10の脂肪酸の構成比率は50重量%以上が好ましく、70重量%以上がより好ましい。とりわけ、20℃での比重が0.94～0.96、20℃での粘度が23～28 cPの中鎖脂肪酸トリグリセリドがさらに好ましい。また、中鎖脂肪酸トリグリセリドは、天然由来のものやエステル交換などにより調製したものなど、いずれも使用することができる。

【0024】

また、本発明で使用する油脂は、部分グリセリドを含むグリセリン脂肪酸エステルであって、好ましくは部分グリセリドを50重量%以上含むグリセリン脂肪酸エステル、より好ましくは部分グリセリドを70重量%以上含むグリセリン脂肪酸エステルである。ここでの部分グリセリドとは、ジグリセリド（1, 2-ジアシルグリセロール、1, 3-ジアシルグリセロール）又はモノグリセリド（1-モノアシルグリセロール、2-モノアシルグリセロール）であり、いずれを用いても良いし、両者が混合されたものを用いても良いが、加工性の観点からジグリセリドが好ましい。また、部分グリセリドは、天然由来のものやエステル交換などにより調製したものなど、いずれも使用することができる。

【0025】

さらに、本発明で使用する油脂は、上記の中鎖脂肪酸トリグリセリドと部分グリセリドが混合されたものを用いても良いし、中鎖脂肪酸の部分グリセリドを用いることもできる。

【0026】

本発明において、グラブレン、グラブリジン、グラブロール、3'-ヒドロキシ-4'-O-メチルグラブリジン、4'-O-メチルグラブリジン、ヒスパグラブリジンBを油脂に溶解する方法は、特に限定されず、通常の攪拌又は混合など

の操作により実施できる。該化合物を含む抽出物、あるいは該化合物の粗精製品を用いる場合、該化合物以外の不純物が含まれているため、攪拌又は混合などの操作により該化合物を油脂に溶解した後に、濾過又は遠心分離などの操作により油脂に不溶な不純物を除去することが望ましい。該化合物の精製品を用いる場合、容易に均一な溶液を得ることができる。また、該化合物を含む抽出物、あるいは該化合物の粗精製品を用いる場合、予めエタノールなどの有機溶媒に溶解し、その溶液と油脂を混合した後に、有機溶媒を留去することもできる。

【0027】

一般に、グラブレン、グラブリジン、グラブロール、3'-ヒドロキシ-4'-O-メチルグラブリジン、4'-O-メチルグラブリジン、ヒスパグラブリジン B は、粉末状態において不安定であり、エタノールなどの有機溶媒へ溶解しても安定性は改善されない。しかし、該化合物を本発明で使用する油脂に溶解することによりその安定性を改善することができる。また、該化合物は難水溶性であることから、本発明で使用する油脂に溶解することによりその吸収性が向上することも期待できる。

【0028】

本発明の生活習慣病予防及び／又は改善用の油脂加工組成物、及び／又は体重増加抑制及び／又は改善用の油脂加工組成物について、その形態は特に限定されず、健康食品や保健機能食品（特定保健用食品、栄養機能食品）などの飲食品、又は医薬品、医薬部外品、化粧品などに利用することができる。例えば、グラブレン、グラブリジン、グラブロール、3'-ヒドロキシ-4'-O-メチルグラブリジン、4'-O-メチルグラブリジン、ヒスパグラブリジン B よりなる群より選ばれた少なくとも1つの化合物を溶解している油脂を、そのまま単独で調理用、ソフトカプセル製剤用、ローション用などとして利用することができる。また油性の対象物と自由に混和することができるため、目的に応じて他の油脂と混合して物性を調整することが可能である。この場合、他の油脂は食品又は医薬品であることが好ましく、その種類及び使用量は、個々の製品に要求される物性や使用温度域などの諸条件を考慮して決定され、その種類及び使用量を調整することにより稠度や融点などの特性をコントロールすることができる。例えば、コーン

油、ナタネ油、ハイエルシンナタネ油、大豆油、オリーブ油、紅花油、綿実油、ヒマワリ油、米糠油、パーム油、パーム核油などの植物油、魚油、牛脂、豚脂、乳脂、卵黄油などの動物油、又はこれらを原料として分別、水添、エステル交換などを行った油脂、あるいはこれらの混合油を使用することができる。

【 0 0 2 9 】

このようにして得られる油脂加工組成物は、サラダ油やフライ油などの液状油脂、マーガリンやショートニングなどの可塑性油脂としての利用や、油中水型エマルジョン、水中油型エマルジョンへ利用することができる。スプレードライなどにより粉体化して粉末油脂として利用してもよい。また、これらを原材料にして製造される飲食用の油脂加工組成物としては、ソフトカプセル、ハードカプセル、タブレット、チュアブル、バー、サシエットなど各種のタイプのサプリメント類、チューインガム、チョコレート、キャンディー、ゼリー、ビスケット、クラッカーなどの菓子類、アイスクリーム、氷菓などの冷菓類、乳飲料、清涼飲料、栄養ドリンク、美容ドリンクなどの飲料、うどん、中華麺、スパゲティー、即席麺などの麺類、蒲鉾、竹輪、半片などの練り製品、ドレッシング、マヨネーズ、ソースなどの調味料、パン、ハム、スープ、各種レトルト食品、各種冷凍食品などが例示され、ペットフードや家畜飼料などへも利用することができる。

【 0 0 3 0 】

さらに、栄養強化を目的として、ビタミン A, C, D, E などの各種ビタミン類を添加、併用してもよいし、呈味剤としての各種塩類、各種香料、乳関連物質、例えば、全脂粉乳、脱脂粉乳、発酵乳、乳脂肪などを添加、併用してもよい。また、上記以外の原材料として、通常の油中水型エマルジョン、水中油型エマルジョンに使用される酸化防止剤、着色剤などを全て使用することができる。

【 0 0 3 1 】

上記の油脂加工組成物をソフトカプセル製剤として利用する場合、カプセル当たりにグラブレン、グラブリジン、グラブロール、3'-ヒドロキシ-4'-O-メチルグラブリジン、4'-O-メチルグラブリジン、ヒスパグラブリジン B からなる群より選ばれた少なくとも 1 つの化合物を、その総量として、0.01 ~ 150 mg、好ましくは 0.1 ~ 150 mg、さらに好ましくは 1 ~ 50 mg 含

んでいることが望ましい。また目的に応じて、ビタミン A, C, D, E などの各種ビタミン類、ミツロウなどの製剤用基剤、乳化剤などをさらに添加してもよい。この場合、乳化剤としては特に限定されず、グリセリン脂肪酸エステル、ショ糖脂肪酸エステル、ソルビタン脂肪酸エステル、ポリソルベート、リン脂質等が挙げられる。中でもグリセリン脂肪酸エステルが好ましく、さらに好ましくはポリグリセリン脂肪酸エステルである。ポリグリセリン脂肪酸エステルとしては、ジグリセリンモノオレイン酸エステルやポリグリセリン縮合リシノール酸エステルが特に好ましい。

【0 0 3 2】

本発明の生活習慣病予防及び／又は改善用の油脂加工組成物、及び／又は体重増加抑制及び／又は改善用の油脂加工組成物に含まれるグラブレン、グラブリジン、グラブロール、3'-ヒドロキシ-4'-O-メチルグラブリジン、4'-O-メチルグラブリジン、ヒスパグラブリジン B が、その生活習慣病予防及び／又は改善の効果、及び／又は体重増加抑制及び／又は改善の効果を発揮するためには、総量として成人一日一人当たり 0.01 ~ 10 mg/kg 体重、好ましくは 0.1 ~ 1 mg/kg 体重を摂取できる量の該化合物を油脂加工組成物中に含んでいることが望ましい。

【0 0 3 3】

【実施例】

以下に、実施例を挙げて本発明をさらに具体的に説明するが、本発明はこれらの実施例に限定されるものではない。

【0 0 3 4】

(実施例 1)

アフガン産甘草 (G. グラブラ) 9.85 kg からエタノール抽出 (49.25 L、45℃、2 時間、2 回抽出)、次いで濃縮により濃縮液 4.4 L を得た。そのうち 3 L をさらに濃縮して、活性炭処理、濃縮により甘草疎水性抽出物を含むエタノール溶液 811.2 g を得た。濃縮液の残り 1.4 L は比較例 1 に使用した。

【0 0 3 5】

上記のエタノール溶液 629.2 g (甘草疎水性抽出物 125.8 g を含有する) と中鎖脂肪酸トリグリセリド (MCT) であるアクター M-2 (理研ビタミン (株) : 脂肪酸組成は C8 : C10 = 99 : 1) 187.6 g を混合し、約 80℃ に保温しながら約 1 時間攪拌した後、減圧濃縮によりエタノールを除去した。吸引ろ過により不溶分を分離して、ろ別後のろ液に MCT 45.7 g をさらに添加し、油脂加工組成物として MCT 溶液 297.0 g を得た。

【0036】

得られた MCT 溶液 1 g を HPLC 用メタノールに溶解し、全量を 100 ml とした。この溶液を試料として下記の条件にて HPLC 分析を行った結果、MCT 溶液 1 g 当たりにグラブレン、グラブリジン、グラブロール、4'-O-メチルグラブリジンがそれぞれ 6.6 mg、30.8 mg、12.6 mg、3.7 mg 含まれていた (総量 53.7 mg、含有量 5.4 重量%)。

HPLC 分析条件

分析カラムは、J'sphere ODS-H80, 4.6 × 250 mm (ワイエムシィ) をカラム温度 40℃ にて使用した。移動相は、20 mM リン酸水溶液に対してアセトニトリルの比率を分析開始から 20 min まで 35% で一定とし、20 min 以降 75 min 後に 70% となるように一定の比率で上昇させ、75 min から 80 min まで 80% で一定とするグラジエント条件で、流速 1 ml/min とした。注入量は 20 μl とし、検出波長は 254 nm とした。各化合物の保持時間は、グラブレンが 40.0 min、グラブリジンが 50.2 min、グラブロールが 58.3 min、4'-O-メチルグラブリジンが 66.8 min であった。

【0037】

(比較例1)

実施例 1 にて使用した濃縮液を乾固・粉碎して得られた甘草疎水性抽出物 100 mg を HPLC 用メタノールに溶解し、全量を 100 ml とした。この溶液を試料として HPLC 分析を行った結果、甘草疎水性抽出物 1 g 当たりグラブレン、グラブリジン、グラブロール、4'-O-メチルグラブリジンはそれぞれ 16.5 mg、90.4 mg、34.1 mg、9.3 mg 含まれていた。

【0 0 3 8】

(比較例 2)

実施例 1 にて使用したエタノール溶液 1 0 0 m g を H P L C 用メタノールに溶解し、全量を 2 0 m l とした。この溶液を試料として H P L C 分析を行った結果、エタノール溶液 1 g 当たりグラブレン、グラブリジン、グラブロール、4'-O-メチルグラブリジンはそれぞれ 3. 4 m g、1 8. 7 m g、7. 1 m g、1. 9 m g 含まれていた。

保存安定性試験

上記の M C T 溶液について、グラブレン、グラブリジン、グラブロール及び 4'-O-メチルグラブリジンの保存安定性試験を加速試験として 8 0 ℃ にて実施した。M C T 溶液を湯浴 8 0 ℃ にて保温し、保存 1 時間、3 時間及び 5 時間におけるグラブレン、グラブリジン、グラブロール、4'-O-メチルグラブリジンの含量をそれぞれ定量した。保存開始時における各化合物の含量を 1 0 0 % とし、保存後／保存開始時の含量の比により、保存安定性を表した。

【0 0 3 9】

保存安定性の試験結果を表 1 に示す。なお表中の化合物 1 はグラブレン、化合物 2 はグラブリジン、化合物 3 はグラブロール、化合物 4 は 4'-O-メチルグラブリジンを表す。

【0 0 4 0】

比較例 1 の甘草疎水性抽出物を用いて同様に保存安定性試験を行った。その結果を表 2 に示す。

【0 0 4 1】

比較例 2 のエタノール溶液を用いて同様に保存安定性試験を行った。その結果を表 3 に示す。

【0 0 4 2】

【表 1】

MCT 溶液	保存安定性			
	化合物 1	化合物 2	化合物 3	化合物 4
開始時	100%	100%	100%	100%
1 時間後	100%	100%	101%	97%
3 時間後	99%	101%	103%	103%
5 時間後	97%	97%	99%	97%

【0043】

【表 2】

甘草疎水性 抽出物	保存安定性			
	化合物 1	化合物 2	化合物 3	化合物 4
開始時	100%	100%	100%	100%
1 時間後	91%	91%	97%	92%
3 時間後	88%	88%	101%	98%
5 時間後	85%	86%	103%	99%

【0044】

【表 3】

エタノール 溶液	保存安定性			
	化合物 1	化合物 2	化合物 3	化合物 4
開始時	100%	100%	100%	100%
1 時間後	94%	96%	95%	89%
3 時間後	93%	94%	95%	93%
5 時間後	91%	93%	95%	90%

MCT 溶液において化合物 1～4 はいずれも安定であったのに対し、甘草疎水性抽出物及びそのエタノール溶液では特に化合物 1 及び 2 が不安定であり、保存時間に従って含量の減少が見られた。

【0045】

これらの結果から、甘草疎水性抽出物及びそのエタノール溶液では化合物 1 及び 2 が不安定であるが、MCT 溶液では化合物 1～4 のいずれも安定であること

が示された。本試験は 8 0 ℃ による加速試験であるため、室温付近の温度条件下ではさらに数日から数ヶ月は安定であることが判明した。

【 0 0 4 6 】

(実施例 2)

実施例 1 と同様の製法により、甘草疎水性抽出物 5 1 . 9 g を含有するエタノール溶液 1 0 3 . 7 g 及び M C T 4 6 8 . 2 g から、M C T 溶液 4 9 7 . 4 g を得た。この M C T 溶液について H P L C 分析を行った結果、M C T 溶液 1 g 当たりグラブレン、グラブリジン、グラブロール、4'-O-メチルグラブリジンがそれぞれ 1 . 2 m g、1 2 . 3 m g、1 . 9 m g、0 . 9 m g 含まれていた（総量 1 6 . 3 m g、含有量 1 . 6 重量％）。

【 0 0 4 7 】

(実施例 3)

内臓脂肪低減作用、体重増加抑制効果

C 5 7 B L / 6 J マウス（雌、8 週齢）に高脂肪・高糖分食を自由摂取にて 8 週間与え、食餌性の肥満状態にした。なお、高脂肪・高糖分食には、カゼイン 2 5 重量％、コーンスターチ 1 4 . 8 6 9 重量％、シュクロース 2 0 重量％、大豆油 2 重量％、ラード 1 4 重量％、牛脂 1 4 重量％、セルロースパウダー 5 重量％、A I N - 9 3 ミネラル混合 3 . 5 重量％、A I N - 9 3 ビタミン混合 1 重量％、重酒石酸コリン 0 . 2 5 重量％、第三ブチルヒドロキノン 0 . 0 0 6 重量％、L-シスチン 0 . 3 7 5 重量％の組成である半固形化精製飼料（オリエンタル酵母（株））を用いた。

その後マウスを 4 群（各群 1 0 匹）に分け A 群、B 群、C 群、D 群とし、実施例 2 の M C T 溶液及び M C T を表 4 のように添加した粉末高脂肪・高糖分食（成分は上記と同様で粉末形態）を飼料として、それぞれ自由摂取にて 8 週間与えた。なお、M C T にはアクター M - 2（理研ビタミン（株））を用いた。

サンプル投与後のマウスをエーテル麻酔下で開腹し、腹大動脈から採血して屠殺した後、腸間膜周辺脂肪、腎臓周辺脂肪、子宮周辺脂肪を摘出し、重量を測定した。なお、腸間膜周辺脂肪重量、腎臓周辺脂肪重量、子宮周辺脂肪重量の和を腹腔内脂肪重量とした。各群の体重推移、及び脂肪重量を測定した結果を表 5 に

示す。

【0048】

各群の摂餌量には差が認められなかったが、B群～D群ではA群に比し有意な体重増加抑制効果が認められた。腸間膜周辺脂肪重量、腎臓周辺脂肪重量、子宮周辺脂肪重量及び腹腔内脂肪重量についても、A群に比しB群～D群では有意な減少が認められた。すなわちマウスに高脂肪・高糖分食を与えると食餌性肥満状態となるが、この食餌に実施例2のMCT溶液を1%以上添加して与えると、有意な体重増加抑制効果及び腹腔内脂肪蓄積抑制効果があることが判明した。

【0049】

この結果から、グラブレン、グラブリジン、グラブロール、3'-ヒドロキシ-4'-O-メチルグラブリジン、4'-O-メチルグラブリジン、ヒスパグラブリジンBを含むMCT溶液は、高脂肪・高糖分食の摂取という過栄養条件下における体重増加の抑制及び内臓脂肪の低減に有効であることが示された。

【0050】

【表4】

群	添加量	
	MCT溶液	MCT
A群	—	3重量%
B群	1重量%	2重量%
C群	2重量%	1重量%
D群	3重量%	—

【0051】

【表 5】

	A群	B群	C群	D群
体重 (g)				
開始時	27.8±3.2	27.6±2.9	27.7±2.9	27.5±2.8
8週間後	31.7±4.1	27.2±3.7*	25.8±2.3**	24.6±1.2**
平均摂餌量 (g/日/匹)	2.15	2.21	2.08	1.95
脂肪重量 (g)				
・腸間膜脂肪	0.615 ±0.184	0.306 ±0.109*	0.238 ±0.093**	0.184 ±0.049**
・腎臓周辺脂肪	0.912 ±0.433	0.446 ±0.207	0.305 ±0.181**	0.186 ±0.076**
・子宮周辺脂肪	1.279 ±0.437	0.670 ±0.353	0.457 ±0.205**	0.307 ±0.131**
・腹腔内脂肪	2.806 ±1.042	1.421 ±0.647	1.000 ±0.461**	0.667 ±0.238**

Mean±SE (n=10), * (p<0.05) ** (p<0.01)

【0052】

(実施例 4)

ソフトカプセル剤の製造 (1)

実施例 1 の MCT 溶液を、ロータリー式ソフトカプセル製造装置を用いてゼラチン皮膜に圧入し、内容量 350 mg のソフトカプセル剤を得た。このカプセル当たりグラブレン、グラブリジン、グラブロール、4'-O-メチルグラブリジンはそれぞれ 2.3 mg、10.8 mg、4.4 mg、1.3 mg 含まれていた (総量 18.8 mg、含有量 5.4 重量%)。

ソフトカプセル剤の製造 (2)

MCT (アクター M-2、理研ビタミン) 57 重量部にジグリセリンモノオレイン酸エステル (DO-100V、理研ビタミン) 3 重量部を溶解し、これに実施例 1 の MCT 溶液 40 重量部を攪拌しながら添加して均一な溶液を調製した。

この溶液を、ロータリー式ソフトカプセル製造装置を用いてゼラチン皮膜に圧入し、内容量 350 mg のソフトカプセル剤を得た。このカプセル当たりグラブレン、グラブリジン、グラブロール、4'-O-メチルグラブリジンはそれぞれ 0.9 mg、4.3 mg、1.8 mg、0.5 mg 含まれていた (総量 7.5 mg、含有量 2.1 重量%)。

【0053】

(実施例5)

粉末油脂の製造

デキストリン70重量部、カゼインNa20重量部を水400重量部に溶解して水相を調製した。

調製した水相に攪拌しながら実施例1のMCT溶液10重量部を添加し、ホモジナイザーにて乳化を行った後、本乳化液をスプレードライにて噴霧乾燥し、粉末油脂を得た。

【0054】

(実施例6)

マーガリンの製造

硬化綿実油（商品名：スノーライト、鐘淵化学工業（株））80重量部、実施例1のMCT溶液20重量部、無塩バター（四つ葉乳業（株））10重量部に、グリセリンモノ脂肪酸エステル（商品名：エマルジーMS、理研ビタミン（株））0.2重量部、レシチン0.2重量部を添加し、60℃に加熱溶解し油相を調製した。

調製された油相84.9重量部に攪拌しながら水15.1重量部を添加し、20分間乳化を行った後、コンビネーターで冷却捏和してマーガリンを作製した。

【0055】

(実施例7)

濃縮乳の製造

実施例1のMCT溶液10重量部を70℃に加温後、レシチン0.1重量部及びポリグリセリン脂肪酸エステル0.1重量部を順次溶解して油相を作製した。

脱脂粉乳25重量部、グリセリン脂肪酸エステル0.1重量部、ショ糖脂肪酸エステル0.1重量部を60℃の水64.6重量部に溶解して水相を調製した。

調製した水相と油相を予備乳化した後、UHT殺菌機にて145℃で4秒間殺菌した。次いで真空冷却した後、均質化機により10MPaの圧力で均質化し、さらに10℃までプレート冷却して加工用濃縮乳を得た。

【0056】

(実施例 8)

マヨネーズの製造

醸造酢 10 重量部、食塩 1 重量部、砂糖 0.6 重量部、マスタード粉末 0.2 重量部、グルタミン酸ナトリウム 0.2 重量部を混合器の中に加え、15～20℃下で攪拌・混合し水相を調製した。その後、米白絞油 68 重量部、実施例 1 の MCT 溶液 10 重量部に卵黄 10 重量部を加え、攪拌乳化して得た乳化液（10～15℃）を少しずつ加えながら 15～20℃下で攪拌し、予備乳化した。次いで、コロイドミルを用いて仕上げ乳化を行いマヨネーズを得た。

【0057】

【発明の効果】

本発明によれば、健康食品や保健機能食品（特定保健用食品、栄養機能食品）などの飲食品、又は医薬品、医薬部外品、化粧品などに利用することができる生活習慣病予防及び／又は改善用の油脂加工組成物、及び／又は体重増加抑制及び／又は改善用の油脂加工組成物を得ることができる。本発明の油脂加工組成物は、インスリン抵抗性の改善、内臓脂肪型肥満、2 型糖尿病、高脂血症、高血圧症などの生活習慣病の予防及び／又は改善、肥満すなわち体重増加の抑制及び／又は改善に有効である。

【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 インスリン抵抗性の改善、内臓脂肪型肥満、2型糖尿病、高脂血症、高血圧症などの生活習慣病の予防及び／又は改善に有効である PPAR γ リガンド活性を有する化合物であるグラブレン、グラブリジン、グラブロール、3'-ヒドロキシ-4'-O-メチルグラブリジン、4'-O-メチルグラブリジン、ヒスパグラブリジン B からなる群より選ばれた少なくとも1つの化合物を含有し、健康食品や保健機能食品（特定保健用食品、栄養機能食品）などの飲食品、又は医薬品、医薬部外品、化粧品などに利用することができる生活習慣病予防及び／又は改善用の組成物、及び／又は体重増加抑制及び／又は改善用の組成物を提供することを課題とする。

【解決手段】 グラブレン、グラブリジン、グラブロール、3'-ヒドロキシ-4'-O-メチルグラブリジン、4'-O-メチルグラブリジン、ヒスパグラブリジン B からなる群より選ばれた少なくとも1つの化合物を中鎖脂肪酸トリグリセリド及び／又は部分グリセリドに溶解させることによって、該化合物の安定性を向上させ、また、飲食品、医薬品、医薬部外品、化粧品などへの加工性も向上させた。

【選択図】 なし

特願 2 0 0 3 - 2 0 4 2 7 5

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [0 0 0 0 0 0 9 4 1]

1. 変更年月日	1 9 9 0 年 8 月 2 7 日
[変更理由]	新規登録
住 所	大阪府大阪市北区中之島 3 丁目 2 番 4 号
氏 名	鐘淵化学工業株式会社